

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ MỸ HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT

Mỹ Hào, ngày tháng 11 năm 2024

V/v phát triển mở rộng diện tích
trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản
xuất vụ Xuân và chủ động điều
khiển ra hoa trên nhãn, vải

Kính gửi:

- Các phòng, ngành thị xã liên quan;
- UBND các xã, phường.

Theo tổng hợp báo cáo tiến độ sản xuất của các xã, phường đến ngày 14/11/2024, toàn thị xã gieo trồng được 35 ha cây vụ Đông, đạt 35% kế hoạch.

Thực hiện Công văn số 2115/SNN-TrTr ngày 12/11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên về việc phát triển mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra hoa trên nhãn, vải.

Nhằm phát triển mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông 2024 - 2025 để bù đắp một phần thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ Xuân năm 2025; chủ động điều khiển ra hoa trên nhãn, vải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; UBND thị xã yêu cầu các phòng, ngành liên quan; UBND các xã, phường và nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với cây trồng vụ Đông

- Mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông ưa lạnh như: Khoai tây, bắp cải, su hào, cải các loại,... và các loại rau màu ngắn ngày, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thị xã giao.

- Tập trung chăm sóc và bảo vệ cây vụ Đông đã trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của từng loại cây: Đảm bảo đủ nước, tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp theo IPM,... để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Không được bón phân hóa học và phun thuốc BVTV trên những diện tích cây vụ Đông sắp cho thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tập trung thu hoạch những diện tích cây vụ Đông đã tới kỳ thu hoạch để tăng giá trị sản phẩm; đồng thời, trồng gối lứa bằng các loại rau ưa lạnh ngắn

ngày (cải ngọt, cải canh, cải bó xôi,...) để tăng hiệu quả kinh tế và đảm bảo đủ nguồn cung cấp thực phẩm trước và sau Tết Nguyên Đán.

2. Công tác cày ải, cày lật đất phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025

Trên những diện tích không có kế hoạch trồng cây vụ Đông: Tranh thủ thời tiết hanh khô, huy động tối đa máy móc để cày ải, cày lật đất trên những chân ruộng không còn đọng nước để đất được ải nở; những chân ruộng còn đọng nước phải tiến hành gạn tháo, tiêu thoát nước trên mặt ruộng, khi mặt ruộng se thì tiến hành cày ải ngay, đảm bảo hoàn thành cày ải xong **trước ngày 31/12/2024**; đối với những chân ruộng trũng, không thể gạn tháo thì giữ nước để làm đầm.

- Trên những diện tích đang trồng và có kế hoạch trồng cây vụ Đông: Khoanh vùng, giữ nước trên mương máng, đầm ao, đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông, nhưng không gây ảnh hưởng đến việc gạn tháo nước để cày ải và làm công tác thủy lợi nội đồng. Sau khi thu hoạch cây vụ Đông xong, phải tiến hành cày lật đất ngay để hạn chế cỏ dại phát triển và diệt nguồn sâu, bệnh hại lưu trú qua đông.

3. Xử lý ra hoa, đậu quả trên nhãn, vải

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và Đài khí tượng thủy văn Hưng Yên, đợt rét đậm đầu tiên khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024. Toàn mùa có từ 4 đến 6 đợt rét đậm, rét hại và tập trung chủ yếu trong tháng 01 và 02/2025. Nhiệt độ thấp nhất từ 7,0 đến 9,0°C. Để tỷ lệ ra hoa trên nhãn, vải cao, tạo tiền đề nâng cao năng suất, đồng thời rải vụ thu hoạch, các địa phương hướng dẫn nông dân áp dụng linh hoạt các biện pháp điều khiển ra hoa như sau:

- Biện pháp khoanh cành: Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng (dao, cưa) khoanh từ 80 - 90% số cành cấp 2, cấp 3, khoanh theo hình tròn hoặc hình xoắn ốc tới phần gỗ, hết đường kính của cành, vết khoanh rộng từ 0,2 - 0,3 cm.

- Biện pháp sử dụng chất ức chế (chỉ áp dụng biện pháp này khi thực sự cần thiết hoặc khi các biện pháp khác không hiệu quả): Tạo rãnh nông xung quanh tán, sử dụng chất ức chế sinh trưởng KClO₃ (Kali clorat) hòa nước để tưới, sau đó tiếp tục tưới nước giữ ẩm cho cây từ 07 - 10 ngày (cách 1 - 2 ngày tưới 1 lần), lượng KClO₃ sử dụng từ 300 - 500 gram/cây (tùy thuộc vào tuổi cây và khả năng mang quả của cây để quyết định lượng hóa chất cho phù hợp).

- Biện pháp kết hợp khoanh cành với sử dụng hóa chất (trường hợp thời tiết ẩm, không có rét đậm, rét hại): Áp dụng trên những diện tích đã ra lộc đông hoặc cây sinh trưởng khỏe, ẩm độ trên vườn cao khó ra hoa và nhận định khả năng ra hoa để sử dụng tưới KClO₃ trước, sau đó căn cứ tình trạng sinh trưởng của cây, áp dụng biện pháp khoanh vỏ sau.

Đối với những diện tích đã ra lộc thu bình thường, mà theo dự báo trong tháng 01 và 02/2025 có từ 2 đợt rét đậm, rét hại trở lên, cây sinh trưởng khỏe, nếu muốn ra hoa chính vụ thì không nhất thiết phải xử lý các biện pháp ức chế nêu trên để cây ra hoa tự nhiên, vừa giảm chi phí vừa không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

*** Lưu ý:**

Đối với những giống có đặc tính cho thu hoạch muộn như nhãn PHM99.2.1 (Nhãn muộn Khoái Châu), nhãn siêu ngọt,... thì căn cứ điều kiện sinh trưởng của cây, điều kiện thời tiết và định hướng thời gian thu hoạch của năm sau,... chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật và thời gian xử lý phù hợp.

Trong thời gian từ khi xử lý ra hoa đến trước khi cây ra hoa, không được bón các loại phân bón hóa học, phân đa lượng (đạm, lân, kali hoặc NPK tổng hợp) để tạo điều kiện cho cây phân hóa mầm hoa và ra hoa được thuận lợi; không phun thuốc bảo vệ thực vật (do áp lực sâu bệnh ở vụ Đông trên cây nhãn, vải thiều) giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường.

UBND thị xã yêu cầu các phòng, ngành liên quan; UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND thị xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Khánh Vĩnh